

Waar vindt u ons?

U vindt ons in:

Regio Emmen

- Emmen
- Erica

Twente

- Almelo
- Delden
- Enschede
- Glanerbrug
- Goor
- Hengelo
- Oldenzaal
- Rijssen

Regio Deventer

- Deventer

Achterhoek

- Winterswijk

Regio Nijmegen

- Bommel
- Gendt
- Lent
- Nijmegen
- Oosterhout

Raadpleeg voor een actueel overzicht van onze vestigingen, de openingstijden en de mogelijkheden onze website

logopedie | direct

www.logopedie-direct.nl

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract

bel met 06 54 32 77 26

Preverbale Logopedie



logopedie | direct

www.logopedie-direct.nl

Welkom bij Logopedie direct

Logopedie direct is een professionele, allround logopedie-praktijk gevestigd op verschillende locaties in Oost-Nederland. Bij Logopedie direct zijn verschillende logopedisten werkzaam met ieder een eigen specialisatie, waardoor er zorg op maat wordt geleverd.

Wat zijn onze specialisaties

Een logopedist begeleidt mensen met een hulpvraag op het gebied van de communicatie in het breedste zin van het woord.

De logopedist onderzoekt, adviseert, werkt preventief, behandelt en begeleidt de cliënt en de omgeving van de cliënt op verschillende gebieden. Dit kan zijn op het gebied van:

- Taal
- Spraak
- Stotteren
- Stem
- Mimetherapie
- Hyperventilatie
- Afasie, dysartrie en dysfagie
- Afwijkende mondgewoonten
- Spraakafzien bij slechthorendheid
- Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
- OMFT



Eet- en drinkstoornissen

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd. Naast de term 'preverbale logopedie' wordt in de praktijk ook de term prelogopedie regelmatig gebruikt.

Problemen

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

We spreken over eet- en drinkproblemen als kinderen moeite hebben met de ontwikkeling van deze vaardigheden. Als kinderen zich vaak verslikken kan er sprake zijn van een slikstoornis. Soms is het nodig dat kinderen sondevoeding krijgen. Bij sondevoeding wordt de voeding door een slangetje (meestal via de neus) in de maag gebracht. Sondevoeding kan om meerdere redenen gegeven worden:

- Als een baby of een jong kind moeite heeft met eten, drinken en/of slikken;
- Als het kind niet kan slikken of voedsel weigert zodat het te weinig voeding binnen krijgt;
- Als het eten risico's met zich mee brengt voor het kind. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor eet- en slikproblemen. Prematuur geboren kinderen zijn soms in de eerste weken te zwak om te drinken. Kinderen met een syndroom zijn soms trager in hun ontwikkeling en hebben daardoor moeite om de nieuwe vaardigheden zoals eten van de lepel of kauwen te leren. Als er sprake is van een hersenbeschadiging kunnen er problemen zijn

met de spierspanning, waardoor zuigen, kauwen of slikken lastig is. Kinderen met anatomische afwijkingen in het mondgebied (zoals een schisis) kunnen ook problemen ondervinden bij het leren van eten en drinken.

Wat doet een logopedist?

De logopedist bekijkt samen met de ouders wat de hulpvraag is en observeert eten en drinken. Soms zijn aanvullende onderzoeken of testen nodig om een goed beeld te krijgen. Bij sondevoeding kan de logopedist helpen om eet- en drinkvaardigheden te ontwikkelen. Voor het afbouwen van sondevoeding wordt vaak samengewerkt met andere disciplines, zoals kinderarts of diëtist. Bij kinderen met complexe problemen wordt er meestal samengewerkt in een multidisciplinair team.

Preverbale logopedie

Als een kind in het ziekenhuis is opgenomen, kan de logopedist uit het ziekenhuis preverbale logopedie geven. Er zal dan een onderzoek plaatsvinden op verzoek van een arts. Aan de hand van uitkomsten van het onderzoek geeft de logopedist adviezen om drinken, eten of slikken te verbeteren. Hierbij wordt met ouders en verpleging samengewerkt.

Ook kan preverbale logopedie in de thuissituatie of in een instelling waar het kind behandeld wordt, plaatsvinden. Deze wordt meestal gegeven door een preverbaal logopedist in de eigen praktijk, de instelling of aan huis. Samen met de ouders/verzorgers zal de logopedist kijken wat de beste manier is om een kind te laten eten of drinken. Er worden adviezen gegeven over een goede houding en technieken, er zal gekeken worden wat de beste fles, speen of beker is. Ook kan het zijn dat er gerichte oefeningen geadviseerd worden om bijvoorbeeld het kauwen te stimuleren.

Maak direct een afspraak:

www.logopedie-direct.nl